



Behandlungsstrategien bei vorzeitigem Blasensprung ab der 37. SSW

Zahlen für schwangere Frauen, bei denen die Fruchtblase in der 37. Schwangerschaftswoche (SSW) oder später geplatzt ist, ohne dass Geburtswehen vorhanden waren (vorzeitiger Blasensprung). Bei den Schwangeren wurde innerhalb von 24 Stunden entweder die Geburt eingeleitet oder es wurde unter ärztlicher Beobachtung abgewartet, ob die Wehen von alleine einsetzten (beobachtendes Abwarten).

100 Frauen mit beobachtendem Abwarten



100 Frauen mit Geburtseinleitung



	Bei wie vielen Frauen trat eine Infektion an der Gebärmuterschleimhaut oder der Eihäute auf?	11	5
	Wie viele Babys litten nach der Geburt unter einer Blutvergiftung (Neugeborenensepsis)?	2	2
	Wie viele Babys erhielten Antibiotika nach der Geburt?	13	8
	Wie viele Babys mussten nach der Geburt auf eine Spezial- oder Neugeborenenintensivstation?	16	12
	Bei wie vielen Frauen wurde ein Kaiserschnitt durchgeführt?	15	15
	Wie viele Babys starben vor oder innerhalb von 28 Tagen nach der Geburt?	<1	<1
	Übrige Frauen		

*Schwerwiegende Schäden sind sehr selten (2 Fälle in je 1.000 Geburten).

Quelle: Middleton et al. Cochrane Database Syst Rev 2017(1):CD005302.

Letzte Aktualisierung: April 2018

www.hardingcenter.de/de/faktenboxen