

Diagnóstico precoce do cancro do ovário

através de realização regular de ecografia endovaginal



Número de mulheres com idade entre 50 e 74 anos sem sintomas relacionados com cancro do ovário que participaram ou não na deteção precoce do cancro do ovário através da realização anual de ecografia endovaginal durante aproximadamente 11 anos.

	1000 mulheres que não participaram no rastreio	1000 mulheres que participaram no rastreio
Benefícios		
Quantas mulheres morreram por cancro do ovário?		Sem diferença: cerca de 3 em cada grupo
Quantas mulheres morreram ao todo?		Sem diferença: cerca de 69 em cada grupo
Danos		
Quantas mulheres sem cancro do ovário experienciaram um falso alarme, tendo sido submetidas a cirurgias desnecessárias (por exemplo, remoção dos ovários saudáveis)?	-	32
Quantas dessas mulheres sofreram complicações relacionadas com a cirurgia*?	-	1

*por exemplo, infeções, tromboses (coágulos de sangue), problemas com a ferida cirúrgica, problemas com anestesia.

Breve resumo: O rastreio do cancro do ovário não reduziu o número de mulheres que morreram por cancro do ovário. Seis mulheres foram corretamente diagnosticadas com cancro do ovário em cada 1000 participantes, comparado com as 32 mulheres que sofreram remoção desnecessária de um ou ambos os ovários saudáveis devido ao rastreio.

Fonte: [1] Jacobs et al. Lancet 2016; 387(10022):945-956. [2] Henderson et al. JAMA 2018;319(6):595-606. [3] Menon et al. Lancet Oncol 2009;10(4):327-340